Ludwig-Maximilians-Universität München
Institut für Informatik
Prof. Dr. Volker Heun

Wintersemester 2010/11
Übungsblatt 11
27. Januar 2011

Algorithmische Bioinformatik II

Abgabetermin: Donnerstag, den 3. Februar, vor der Vorlesung

Die erzielten Punkte werden als Bonus-Punkte gewertet, d.h. dass die erzielten Punkte bei der Zulassung zur Klausur berücksichtigt werden, die zu erzielenden Punkte jedoch nicht.

Aufgabe 1 (8 Punkte)

Wirf einen Würfel so oft, bis er sechs Augen anzeigt und notiere diese Anzahl als N.

Erinnerung: diese Anzahl ist geometrisch zum Parameter p verteilt, d.h.

$$\mathrm{Ws}[X = N] = (1-p)^{N-1} \cdot p,$$

wobei p die Wahrscheinlichkeit ist, dass mit dem Würfel eine Sechs gewürfelt wird.

a) Überprüfe mit Hilfe des Likelihood-Ratio-Tests die Null-Hypothese ($p = 1/6$) gegen die Alternativ-Hypothese ($p = 1/7$) für das Signifikanz-Niveau $\alpha = 0.05$.

b) Überprüfe mit Hilfe des Likelihood-Ratio-Tests die Null-Hypothese ($p = 1/7$) gegen die Alternativ-Hypothese ($p = 1/6$) für das Signifikanz-Niveau $\alpha = 0.05$.

Aufgabe 2

Betrachte das folgende Modell $M(\theta)$ mit

$$\theta \in \Theta = \{(p_1, \ldots, p_4) \,:\, p_i \in [0,1] \wedge p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 1 \wedge p_1 + p_2 = p_3 + p_4\}$$

für das Werfen eines Tetraeders, wobei bei einem Wurf mit Wahrscheinlichkeit p_i die Seitenfläche i unten liegt. Weiter sei die Wahrscheinlichkeit für die Seitenflächen 1 und 2 genau so groß wie für 3 und 4.

Angenommen, der Tetraeder wurde N-mal geworfen und dabei kam die Seite i genau N_i-mal unten zu liegen. Bestimme den Maximum-Likelihood-Schätzer $\theta^* \in \Theta$.

Aufgabe 3

Sei $Z_n \in [1:6]$ eine Zufallsvariable, die dem Ausgang des n-ten Wurf eines Würfels entspricht (wobei alle sechs Ausgänge gleichwahrscheinlich sind). Betrachte

$$X_n = \left(\sum_{i=1}^{n} Z_i\right) \bmod 5.$$

a) Zeige, dass $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Markov-Kette ist.

b) Bestime das zugehörige Markov-Modell (Q, P, π).

c) Bestimme die stationäre Verteilung.